


Aperçu de la biodiversité actuelle des Coléoptères dans les pinèdes françaises



F. KOUTROUMPA, F-X. SAINTONGE,
G. ROUX-MORABITO et D. ROUGON




Un dispositif de piégeage standardisé en vue de capturer des *Monochamus* (principal vecteur du nématode du pin)




Le piège

Les autres coléoptères capturés permettent de faire un état de la faune des coléoptères des boisements résineux



les scolytes sont majoritaires dans l'échantillon



Les pinèdes de l'ouest ont été colonisées au cours du 20^{ème} siècle par le cortège des insectes des résineux, tel *Spondylis buprestoides* ci dessus représenté.

Contact : F-X. SAINTONGE

Merci à MM. ADAM, ANSONNAUD, BELLOIR, COSTE, DELPONT, DEYPARRAGUIRE, DORFFER, DURAND, de FALVARD, FEE, FEDOU, GAUVRIT, GERMAIN, GIRARD, GOURGUES, GRANDJEAN, HAUTCLOCQ, HENRY, HINTZY, HUTTINGER, JARSAILLON, LETZ, LEVANNIER, MALOT, MICAS, MURE, NINOSQUE, PAGNIER, PELLOQUIN, RULLIERE, SCHMUCK et VAN MEER.