


## Quelques indicateurs de la santé des forêts (1989-2021)

### Some indicators of French forest health


A qualitative overview of 14 important French forest health problems (6 pest insects or groups of pest insects, 4 fungal diseases, 4 climatic constraints) is proposed. The 10 principal forest trees species states of health are also evaluated. France was divided into 8 large ecological zones (3 plain regions: north-western France, north-eastern France and south-western France, 4 mountain regions: Massif Central Pyrenees, Alpes-Jura and Vosges, and the mediterranean region), and the intensity (3 levels: slight, medium and severe) of these 14 problems was assessed yearly for each zone.

Chaque année, le Département de la santé des forêts propose un panorama schématique de la santé des forêts à l'aide d'[indicateurs](#) choisis pour leur importance économique et spatiale pour mettre en perspective leurs évolutions spatiales et temporelles. Il s'agit de [6 insectes](#), [4 champignons](#) et [4 problèmes abiotiques](#). En plus, l'état sanitaire des essences principales est évalué ([5 feuillus](#) et [5 résineux](#)).

Le territoire national est découpé de façon schématique en 8 grandes régions écologiques (3 grands domaines bioclimatiques: les plaines, les montagnes et la zone méditerranéenne), correspondant à des regroupements pertinents des grandes régions écologiques (GRECO) retenues par l'inventaire forestier national (IGN/IFN).



Découpage schématique de la France



Greco de l'IGN

Pour chaque indicateur, l'intensité du problème a été évaluée selon une grille de niveaux symbolisés par des couleurs :

- non significatif du fait de l'absence ou la faible présence de l'hôte
- dégâts faibles ou nuls
- dégâts modérés
- dégâts importants

L'attribution de la note d'intensité de chaque indicateur s'appuie sur l'avis d'experts des pôles de la santé des forêts, fondé essentiellement sur l'analyse des observations réalisées par les correspondants-observateurs (plus de 10 000 observations par an à l'échelle nationale) ou par les personnels permanents des pôles eux-mêmes.

Rédacteurs : François-Xavier Saintonge, Morgane Goudet

### Etat sanitaire moyen des ESSENCES FEUILLUES

Chêne sessile



Chêne pédonculé



Hêtre



Châtaignier



Peupliers



### Etat sanitaire moyen des ESSENCES RESINEUSES

Pin maritime



Pin sylvestre




Epicéa



Douglas



Sapin




## LES INSECTES

La processionnaire du pin – *Thaumetopoea pityocampa*



Les défoliateurs précoces du chêne – *Tortrix viridana*, *Operophtera brumata*, *Eramis defoliaria* ...



Le bombyx disparate – *Lymantria dispar*




Processionnaire du chêne - *Thaumetopoea processionea*



non renseigné



Le typographe de l'épicéa – *Ips typographus*



Hylobe - *Hylobius abietis*



non renseigné



## LES CHAMPIGNONS

Les rouilles des peupliers – *Melampsora spp.*



L'oïdium du chêne – *Erysiphe spp.*




Sphaeropsis des pins – *Diplodia sapinea*



Maladie des bandes rouges – *Dothistroma spp.*



non renseigné



## LES DÉGATS ABIOTIQUES

Dégâts de gel tardif au printemps



Sécheresse estivale



Rouissement physiologique du douglas



non renseigné



Réussite des plantations



non renseigné

