



Monsieur Emmanuel KOEN
SDSPV – DGAL
251, rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15

Paris, le 24 mars 2025

Objet : demande d'AMM 120 jours pour la spécialité CHRYSOTEC pour le traitement des parties aériennes sur tomate et aubergine sous abri

Monsieur,

Chrysodeixis chalcites appartient à la famille des Noctuidés et à la sous-famille des Plusiines. Originaire des régions tropicales et subtropicales, cette espèce est la plus fréquemment rencontrée **en serre**. Ses **chenilles polyphages provoquent des dégâts** significatifs sur diverses cultures particulièrement sensibles, notamment le concombre, l'**aubergine**, le poivron, la **tomate**.

Présent en région **Ouest** de la France, *Chrysodeixis chalcites* affecte près de 600 ha (Agreste, décembre 2023). La zone la plus affectée étant Paimpol (Côtes d'Armor) avec 130 ha, où 80 % des serres sont touchées. Le Finistère est également concerné, avec 30 à 40 ha. Ce ravageur **menace jusqu'à 35 à 40 % de la production nationale de tomates sous serre**, soit 150 000 à 175 000 tonnes en 2023, avec des **pertes** possibles **allant jusqu'à un tiers** à court terme. Le parasite peut, dès l'arrivée des plants, **ravager rapidement** les cultures **si aucune action n'est prise**.

Ce lépidoptère migrateur annuel du sud de l'Europe **apparaît chaque année** dans les régions plus nordiques, où il ne semble pas capable d'hiverner à l'extérieur. Toutefois, il **peut survivre d'une année sur l'autre dans les serres**, ce qui engendre une **pression constante sur les cultures sensibles**. Son cycle de développement en serre permet le **chevauchement de plusieurs générations simultanément**, rendant ainsi la **lutte** contre ce ravageur particulièrement **difficile**, surtout en fin d'été et en automne.

Les femelles non fécondées de *Chrysodeixis chalcites* **ne pondent que des œufs stériles**. Les œufs sont généralement déposés isolément et répartis principalement sur la face inférieure des feuilles. Les noctuelles étant principalement actives la nuit, leur surveillance et leur gestion nécessitent des moyens de lutte adaptés.

La **confusion sexuelle sur tomates en serre** pour le contrôle de *Tuta absoluta* est **déjà utilisée** dans de nombreux pays avec succès dont la **France**. La société SEDQ, qui a déjà développé et homologué en France la confusion sexuelle sur *Tuta absoluta* (TUTATEC n°AMM 2200133), vient de mettre au point un système de confusion équivalent à celui de TUTATEC sur *Chrysodeixis chalcites*. Cette technique consiste à libérer de façon homogène et régulière le bouquet phéromonal synthétique imitant celui produit par la femelle de *Chrysodeixis chalcites*. Les phéromones utilisées perturbent les mâles, ainsi leur système olfactif est perturbé et les **accouplements diminués**. La libération des phéromones synthétiques dans l'air se fait à l'aide de diffuseurs.

L'utilisation de la **spécialité CHRYSOTEC** permet de **réduire l'utilisation d'insecticides, limitant** par la même occasion **l'exposition des salariés** aux insecticides foliaires. Elle favorise

une **meilleure gestion du *Chrysodeixis chalcites***, tout en **limitant la présence de résidus** sur les fruits commercialisés.

Compte tenu de ces éléments **nous sollicitons une AMM 120 jours dérogatoire, à partir du 1^{er} mai 2025, pour la spécialité CHRYSOTEC pour l'usage suivant :**

- **16953113 - Tomate - Aubergine * Trt Part.Aer. * Chenilles phytophages (sous abri)**

Restant à votre disposition, nous vous remercions de l'intérêt que vous voudrez bien porter à notre demande et vous prions de recevoir, Monsieur, nos sincères salutations.


Coprésident de Légumes de France

Cyril Pogu



Président du CERAHEL

Marc Kerangueven



Copies : S. SZILVASI– DGAL ; C. LAGRUE, M. DELPORTE, J-H BELLAND, D. TAILLIEZ, C., C. HALGAND, P. SAVARIT, P. PIERRE, E. BRAJEUL– CTIFL ; J. SERANDOUR – CERAHEL ; C. POGU, S. BERTUCELLI, G. ROCHE – Légumes de France